

❖ **పంట సేకరణ :** విత్తిన 150 నుండి 180 రోజులకు పంటతయారు అవుతుంది. వీటికాయలు ఎరుపు రంగులోనికి మారినపుడు గాని లేదా ఆకులు పూర్తిగా ఎండిపోయినపుడు గాని అశ్వగంధ వేర్లను సేకరించుకోవాలి. మొక్కను సమూలంగా పీకి వేరు కాండము విభజించాలి. వేర్లను 7 నుంచి 10 సెం.మీ ముక్కలుగా చేసుకుని నీడన ఆరబెట్టుకోవాలి. అశ్వగంధ వేర్లు బాగా ఎండిన తరువాత గ్రేడింగ్ చేసుకుని నిలువ చేసుకోవడం వలన రైతులకు అధిక ధర వస్తుంది. ఈ గ్రేడింగ్ ను నాలుగు రకాలుగా విభజించారు.

ఏ గ్రేడు వేర్లు పలుచగా ఉండి లోపలి భాగము స్వచ్ఛమైన తెలుపు రంగులో ఉండి పొడవు 7 సెం.మీ పైగా ఉండి 1 నుండి 1.5 సెం.మీ. మందము కలిగి ఉండాలి.

బి గ్రేడు వేర్లు పలుచగా ఉండి లోపలి భాగము తెలుపు రంగులో ఉండి పొడవు 5 సెం.మీ. పైగా ఉండి 1 సెం.మీ. మందము కలిగి ఉండాలి.

సి గ్రేడు వేర్లు 3 నుండి 4 సెం.మీ. పొడవు ఉండి చిన్న శాఖలు కలిగి ఉండి లోపలి భాగము పసుపు రంగులో ఉంటాయి.

తక్కువ గ్రేడు లేదా చివరి గ్రేడు వేర్లు చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పలుచగా, సన్నగా ఉండి లోపలి భాగము పసుపు రంగులో ఉంటాయి.

❖ **దిగుబడి:** ఆర బెట్టిన వేర్లు ఒక ఏకరాకు 200 నుండి 300 కిలోల వరకు దిగుబడి వస్తుంది.

❖ **గమనిక :** నేల స్వభావం వాతావరణ పరిస్థితులు, మార్కెట్ సరళి ఆర్థికాంశాలను ప్రభావితం చేస్తాయి.

❖ **ఉపయోగములు :** వేర్లను నరాల బలహీనతను నివారించడానికి, వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెంచుటలోను మరియు అల్లర్ల నివారణలోను ఉపయోగిస్తారు. అశ్వగంధ వేరు చూర్ణాన్ని పంచదారతో కలిపి నేతితో తీసుకున్నట్లయితే నిద్రలేమి నుండి నివారణ పొందవచ్చును.



తెలంగాణ రాష్ట్ర ఔషధ మొక్కల బోర్డు

6వ అంతస్తు, TSGLI బిల్డింగ్, తిలక్ రోడ్, ఆబిడ్స్, హైదరాబాద్ - 500 001.
ఫోన్ : +91 40 66364094, 24764096. website : www.tsmpb.in
E-mail : tsmapb@gmail.com

అశ్వగంధ సాగు వివరములు (విధానియ సోమ్మిఫెరా)



సాధారణ నామము	:	అశ్వగంధ
శాస్త్రీయ నామము	:	విధానియ సోమ్మిఫెరా
కుటుంబము	:	సోలనేసి
ప్రాంతీయ నామము	:	అశ్వగంధ / పెన్నేరుగడ్డలు
వాణిజ్యనామము	:	అశ్వగంధ
ఉపయోగపడు భాగములు	:	వేర్లు

తెలంగాణ రాష్ట్ర ఔషధ మొక్కల బోర్డు

ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ



అశ్వగంధ

(విధానియా సోమ్మిఫెరా)

- ❖ **పరిచయము :** విధానియా సోమ్మిఫెరా అనే శాస్త్రీయ నామం కలిగిన ఈ మొక్క సోలనేసీ కుటుంబానికి చెందినది. అశ్వగంధ లేదా పెన్నేరు గడ్డలుగా పిలువబడే ఈ మొక్క నిటారుగా పెరిగే శాఖాయుతమైన గుల్మము, ఒక మీటరు ఎత్తువరకు పెరుగుతుంది. పత్రాలు పండినప్పుడు పసుపు రంగుకు మారతాయి. విత్తనాలు చిన్నగా లేతపసుపు రంగులో

ఉంటాయి. వేర్లు సుమారు 10 నుండి 17.5 సెం.మీ. పొడవు మరియు 0.5-1.5 సెం.మీ. వెడల్పు కలిగి ఉంటాయి. వేర్లు లేత పసుపుతో కూడిన తెలుపు రంగుతో ఉండి చిరు చేదును కలిగి ఉంటాయి.



- ❖ **వ్యాప్తి :** దీనిని తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాజస్థాన్, పంజాబ్, కర్ణాటక మరియు మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో విరివిగా సాగు చేస్తున్నారు. నీమచ్ మరియు మాండే సర్ మార్కెట్లు అశ్వగంధ ఎగుమతికి ప్రసిద్ధిగాంచాయి. అశ్వగంధ కొనుగోలుదారులు, దిగుమతిదారులు, ప్రొసెసింగ్ చేసేవారు, ఆముర్వేద ఔషధాలు తయారు చేసేవారు, అశ్వగంధ కొనుగోలుకు ఈ మార్కెట్లను ఎంచుకుంటారు. మన రాష్ట్రంలో మహబూబ్ నగర్, మెదక్, నల్గొండ, ఖమ్మం, రంగారెడ్డి జిల్లాలలో సాగుచేస్తున్నారు.

- ❖ **నేలలు :** ఇసుక గరప నేలలు లేదా తేలికపాటి ఎర్ర నేలలు అనుకూలం. ఈ నేలల్లో సాగు చేసినప్పుడు వర్షాభావ పరిస్థితులలో తడులు అందించ వలెను. ఇసుకతో కూడిన నల్ల నేలలలో కర్నూలు మరియు అనంతపురము జిల్లాలలో గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా వర్షాధారంగా, విజయవంతముగా 10,000 ఎకరాలకు పైగా సాగు చేయ బడుచున్నది. నీరు నిలువ ఉండే నేలలు అశ్వగంధ సేద్యానిక పనికిరావు.

- ❖ **వాతావరణం :** సగటున కనీసం 600-700 మి.మీ. వర్షపాతం అవసరం. దీని సాగుకు 28 నుండి 38^o ఉష్ణోగ్రత అవసరం. దీనిని సముద్ర మట్టానికి 1500 మీటర్లు ఎత్తు వరకు సాగు చేయవచ్చును.. పొడి వాతావరణము సాగుకు అనుకూలం. పంట చివర దశలో ఒకటి-రెండు వర్షాలు పడినట్లయితే అధిక దిగుబడులు పొందవచ్చును.
- ❖ **రకాలు :** అశ్వగంధలో మధ్యప్రదేశ్ లోని జవహర్ కృషి విధ్యాలయం వారి జవహర్ -20 రకము, CIMAP లక్నో వారి రక్షిత, పోషిత రకాలు మరియు నాగోలి అనే ప్రాంతీయ రకములు కూడా సాగులో ఉన్నవి.
- ❖ **పంటకాలము :** జూలై రెండవ వారము నుండి ఆగష్టు రెండవ వారం వరకు విత్తుకోవచ్చు. పంటకాలము 150 రోజులు (జవహర్ రకాలనికే పంటకాలం 180 రోజులు)
- ❖ **విత్తన మోతాదు :** ఏకరాకు 7-8 కిలోలు కనీసం 5 రెట్లు ఇసుకతో కలిపి వెదజల్లినట్లయితే విత్తనములు గుంపులుగా పడకుండా చూడవచ్చు. విత్తనాలు చిన్నవిగా ఉండటము వలన 1 నుండి 3 సెం.మీ. లోతులో పడేటట్లు మాత్రమే చూసుకోవాలి, ఎక్కువ లోతులో పడినట్లయితే ఆ విత్తనము మొలకెత్తే అవకాశము తక్కువగా ఉంటుంది.
- ❖ **విత్త దూరం :** మొక్కకు మొక్కకు మధ్య 7 నుండి 10 సెం.మీ., వరసకు వరసకు మధ్య 25 నుండి 30 సెం.మీ. ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగుచేసినప్పుడు విత్తనమును నేరుగా వెదజల్లుకుంటే లాభదాయకము.
- ❖ **ఎరువులు :** ఏకరాకు 4 నుంచి 5 టన్నుల పశువుల ఎరువు దుక్కిలో వేసుకోవాలి, అధిక దిగుబడికోసం 20 కిలోల భాస్వరము, 16 కిలోల పోటాష్ ఆఖరి దుక్కిలో వేసుకోవాలి.
- ❖ **అంతర కృషి :** మడుల్లో పంటకాలంలో కలుపు లేకుండా చూడాలి. ఈ పంటను వర్షాధారంగా పండించవచ్చును.
- ❖ **సస్పరక్షణ :** సాధారణంగా అశ్వగంధ పంటకు వచ్చు తీవ్రమైన తెగుళ్లు ఏమీ లేవు.